

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



IMPfung	ALTER	in Wochen:		in Monaten							in Jahren												
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60				
		U4		U5			U6				U7		U7a/U8		U9		U10		U11/11		J2		
Rotaviren		G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)																		
Tetanus <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>				N			A1	N	A2	N				A <sup>e</sup>			
Diphtherie <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>				N			A1	N	A2	N				A <sup>e</sup>			
Keuchhusten <sup>b</sup> Pertussis		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>				N			A1	N	A2	N				A3 <sup>e</sup>	N		
Hib <sup>b</sup> Haemophilus influenzae Typ b		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>				N													
Kinderlähmung <sup>b</sup> Poliomyelitis		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>					N				A1					N			
Hepatitis B <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>							N										
Pneumokokken <sup>b</sup>		G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>				N												S <sup>g</sup>	
Meningokokken C								G1						N									
Masern						G1	N		G2					N								S <sup>f</sup>	
Mumps, Röteln						G1	N		G2					N									
Windpocken Varizellen						G1	N		G2					N									
HPV Humane Papillomviren														G1 <sup>d</sup>	G2 <sup>d</sup>	N							
Herpes zoster																						G1 <sup>h</sup>	G2 <sup>h</sup>
Grippe Influenza																							S (jährlich)

Nächste Impftermine



### ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter  $\geq$  15 Jahren oder bei Impfabstand von  $<$  5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

- f** Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen  $\geq$  18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
  - g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
  - h** Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.